SURVEI SERANGAN HAMA BARU *Paracoccus marginatus* (Hemiptera: Pseudococcidae) PADA PERTANAMAN PEPAYA DI KABUPATEN BOGOR

Lidya M. Ivakdalam

Staf Pengajar FAPERTA UMMU-Ternate, *e-mail*: -

ABSTRAK

Hama tanaman pepaya, *Paracoccus marginatus* Williams and Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae) menyerang ribuan tanamn pepaya di Bogor pada tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan daerah persebaran dan tingkat serangan kutu putih pepaya, yang berlangsung dari bulan Agustus sampai Oktober 2009. Sampel penelitian diambil pada daerah-daerah sentra produksi pepaya di Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serangan hama *P. marginatus* telah tersebar merata di seluruh wilayah Bogor, dengan serangan berat terutama terjadi di wilayah barat dan tengah Kabupaten Bogor. Kecamatan yang menunjukkan tingkat serangan berat pada semua desa survei adalah Kecamatan Sukaraja, Caringin, Megamendung, Bojonggede, Tajurhalang, dan Rancabungur.

Kata Kunci: Hama tanaman pepaya, *Paracoccus marginatus*, Bogor

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara pengekspor buah pepaya (*Carica pepaya* L.) dengan produktivitas yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun dibandingkan dengan negara China, Thailand dan Filipina yang terus meningkat (BPS 2006). Negara-negara yang berpotensi untuk menerima ekspor buah-buah Indonesia adalah kawasan Eropa, Amerika, dan Asia Pasifik. Tahun 2005 buah pepaya Indonesia telah diterima di China, Hongkong, Saudi Arabia, Inggris, Jerman, dan Belanda (BPS 2006).

Produksi buah pepaya Indonesia tahun 2004 mencapai 73,26 ton/ha dan pada tahun 2005 produksi menurun menjadi 64,67 ton/ha (FAO 2005). Pada tahun 2006 produksi meningkat menjadi 80,22 ton/tahun namun, pada tahun 2007 produksi kembali mengalami penurunan menjadi 77,85 ton/tahun (Ditjen Hortikultura 2008). Sementara volume ekspor buah pepaya Indonesia pada tahun 2006 sebesar 0,14 ton/tahun dan mengalami penurunan volume ekspor pada tahun 2007 sebesar 0,1 ton/tahun, sedangkan volume impor mencapai 0,06 ton/tahun pada tahun 2007 (Ditjen Hortikultura 2008).

Pada pertengahan tahun 2008 ribuan pohon pepaya di Bogor mati karena serangan hama

baru. Hasil identifikasi oleh Dr Waston dari Kalifornia Amerika Serikat mengungkapkan bahwa hama tersebut adalah *Paracoccus marginatus* Williams & Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae) (Rauf 2009). Tidak hanya itu kehadiran *P. marginatus* di Bogor merupakan penemuan pertama tersebarnya hama ini di Asia (Muniappan *et al.* 2008). Hama ini diperkirakan masuk ke Indonesia karena terbawa pada tanaman hias yang diimpor dari wilayah Amerika (Rauf 2009).

Hama tersebut merupakan organisme pengganggu tanaman (OPT) pepaya di Amerika, yang pertama kali dideskripsikan oleh Williams & Granara de Willink (1992). Hama *P. marginatus* awalnya berasal dari daerah neotropis di Belize, Costa Rica, Guatemala, dan Meksiko. Setelah itu Miller & Miller (2002) mendeskripsikan kembali spesies kutu *P. marginatus* ini dan menyatakan bahwa serangga ini merupakan serangga polifag yang menjadi hama pada berbagai macam tanaman sayuran, buah, dan tanaman hias tropis. Beberapa tanaman inang *P. marginatus* antara lain *Carica papaya* L. (pepaya), *Citrus* spp. (jeruk), *Persea americana* P. Mill. (alpukat), *Solanum melongena* L. (terung), *Hibiscus* spp. (kembang sepatu), *Plumeira* spp. (kemboja), dan *Acalypha*

spp. (ekor kucing). Walker *et al.* (2006) menyebutkan bahwa spesies hama tersebut memiliki tanaman inang lebih dari 25 genus tanaman. Sementara di Hawaii hama ini menyerang tanaman pepaya, kamboja, kembang sepatu, dan *Jatropha* spp (Heu *et al.* 2007).

Serangga *P. marginatus* masuk ke Karibia pada sekitar awal tahun 1990 dan mulai tersebar luas di kepulauan Karibia pada tahun 1994 (Walker *et al.* 2006). Pada tahun 1998, *P. marginatus* dilaporkan terdapat di Florida Amerika Serikat, di Pantai Palm, Manatee, dan kawasan Broward, pada tanaman kembang sepatu (Miller *et al.* 1999). Pada tahun 2002 tercatat telah menginfestasi berat tanaman pepaya di Guam (Meyerdirk *et al.* 2004, Walker *et al.* 2006) dan tahun 2004 terdapat di Republik Palau. Sejak menyebar ke Karibia, Amerika Serikat, dan Kepulauan Pasifik, *P. marginatus* ditemukan telah menetap di hampir seluruh Kepulauan Karibia, Florida, Guam, Republik Palau, dan Hawaii.

Hama *P. marginatus* berpotensi menyerang berbagai tanaman di Amerika Serikat, khususnya di Florida, dan negara-negara bagian seperti Kalifornia dan Hawaii, yang memiliki jenis komoditi pertanian yang sama. Negara bagian Texas bagian selatan yang merupakan penghasil jeruk terbesar ketiga (CNAS 2007) juga rentan terhadap serangan *P. marginatus* (Amarasekare *et al.* 2008). Di Indonesia serangan terparah tercatat di Kecamatan Sukaraja (Rauf 2009) yang merupakan daerah sentra penghasil pepaya di Bogor (Anonim 2008).

1.2. Tujuan Penelitian

Memetakan daerah persebaran hama *Paracoccus marginatus* dan menentukan tingkat serangannya pada pertanaman pepaya di Bogor.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di wilayah barat dan tengah dari Kabupaten Bogor, karena kedua wilayah ini merupakan daerah sentra pertanaman pepaya dan merupakan tempat pertama kali dilaporkannya serangan kutu putih *P. marginatus*.

Penelitian berlangsung sejak Agustus sampai Oktober 2009, dan kegiatannya meliputi pengamatan langsung di lapangan untuk menentukan tingkat serangan dan persebaran kutu *P. marginatus*.

2.1. Penentuan Persebaran dan Tingkat Serangan Kutu Putih Pepaya

Penentuan lokasi dan jumlah contoh untuk keperluan pemetaan persebaran serangan dan perhitungan tingkat serangan dilakukan berdasarkan metode *Snowball* (Black & Dean 2001). Metode ini dipilih karena kurangnya informasi dan data petani pepaya pada tingkat kecamatan dan desa. Jumlah desa contoh berkisar antara 1-7 desa per kecamatan. Pemetaan persebaran serangan diamati dengan cara mencatat ada tidaknya *P. marginatus* pada tanaman pepaya di lahan contoh.

Pengamatan tingkat serangan dilakukan penghitungan intensitas serangan pada 1-10 petani pepaya per desa. Jumlah tanaman contoh yang diamati berjumlah 20 per petakan lahan bila populasi > 30 pohon, tetapi seluruh pohon diamati bila jumlahnya < 30 pohon. Penentuan skor serangan dibagi dalam empat kategori yaitu: tidak terserang diberi skor nol, serangan ringan diberi skor satu, serangan sedang skor dua, dan serangan berat skor tiga, seperti terlihat pada kriteri di bawah:

Tabel 1. Penentuan Skor Serangan Hama

Kategori serangan (i)	Skor (v)
Sehat	0
Seperempat atau lebih rendah tajuk terserang	1
Seperempat hingga separuh tajuk dan atau buah terserang	2
Lebih dari separuh tajuk dan atau buah terserang	3

Intensitas serangan (I) dihitung menggunakan rumus Townsend & Heuberger dalam Unterstenhofer (1976) sebagai berikut:

$$I = \frac{\sum(n_i \times v_i)}{NV} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- n_i = jumlah pohon dengan kategori serangan i
- v_i = nilai skor untuk kategori serangan i
- N = jumlah pohon yang diamati
- V = nilai skor tertinggi

Berdasarkan hasil penghitungan dengan rumus diatas, serangan *P. marginatus* dikategorikan sebagai serangan ringan bila $I \leq 25\%$, sedang bila $25\% < I \leq 50\%$, berat bila $50\% < I \leq 75\%$, dan sangat berat bila $I > 75\%$. Untuk melihat persebaran hama kutu putih ini di Bogor, maka kemudian dibuat peta persebaran serangan hama ini. Pembuatan peta berdasarkan

nilai intensitas serangan per desa dengan menggunakan *Softwer Arcview GIS versi 3.3*. Selain melalui pengamatan langsung di lapangan, data persebaran dan tingkat serangan *P. marginatus* diperoleh dari laporan Dinas Pertanian, terutama untuk wilayah Kota Bogor.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Keadaan Umum Kabupaten Bogor

Wilayah Kabupaten Bogor berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan secara geografis terletak pada posisi 6°19' - 6°47' Lintang Selatan, 106°1' - 107°103' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.301,95 km². Batas wilayah Kabupaten Bogor meliputi: sebelah utara berbatasan dengan Kota Depok, sebelah barat dengan Kabupaten Lebak, sebelah barat daya dengan Kabupaten Tangerang, sebelah timur dengan Kabupaten Purwakarta, sebelah timur laut dengan Kabupaten Bekasi, sebelah selatan dengan Kabupaten Sukabumi, dan sebelah tenggara berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan dan 427 desa, yang dibagi dalam tiga wilayah pembangunan. Wilayah barat meliputi 13 kecamatan yaitu: Kecamatan Jasinga, Parung Panjang, Tenjo, Cigudeg, Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Tenjolaya, Cibungbulang, Ciampea, Pamijahan, dan Rumpin. Wilayah tengah terdiri dari 20 kecamatan yaitu: Kecamatan Gunung Sindur, Parung, Ciseeng, Kemang, Rancabungur, Bojonggede, Tajurhalang, Cibinong, Sukaraja, Dramaga, Cijeruk, Cigombong, Caringin, Ciawi, Megamendung, Cisarua, Citereup, Babakan Mandang, Ciomas dan Tamansari. Wilayah timur terdiri dari tujuh kecamatan yaitu: Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal, Jonggol, Suka Makmur, Tanjungsari dan Cariu.

Berdasarkan ketinggian tempat wilayah Kabupaten Bogor di bagi dalam 3 kategori: (1) ketinggian di bawah 500 m di atas permukaan laut (dpl) yang meliputi 234 desa, (2) ketinggian antara 500 – 700 m dpl yang meliputi 144 desa dan, (3) ketinggian di atas 700 m dpl yang meliputi 49 desa. Iklim Kabupaten Bogor menurut klasifikasi *Schmidt & Ferguson* termasuk iklim tropis tipe A (sangat basah) pada bagian selatan, dan tipe B (basah) dibagian utara. Suhu berkisar antara 20 - 30°C dan curah hujan tahunan antara 2500 mm sampai lebih dari 5000 mm/tahun, kecuali untuk wilayah utara Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan DKI Jakarta, Tangerang dan Bekasi curah hujan tahunan kurang dari 2500 mm/tahun.

Kabupaten Bogor selain bergerak dalam sektor industri juga mengembangkan sektor pertanian. Tahun 2008 terdapat 2.125 kelompok tani yang dibagi dalam kelas pemula 850 kelompok, kelompok lanjut 987 kelompok, kelompok madya 250 kelompok, dan kelompok utama 24 kelompok. Pertanaman pepaya dengan luas 241.06 ha dan produksi 21.07 ton. Sektor tanaman palawija dengan luas tanam 23.28 ha, luas panen 17.64 ha, produksinya 266,75 ton yang terdiri dari beberapa komoditi. Khusus untuk komoditi ubi kayu dengan luas 9.464 ha, mampu menghasilkan produksi sebesar 190.411 ton (Monografi Dinas Pertanian 2009).

3.2. Serangan dan Persebaran Hama Kutu Putih Pepaya

Kutu putih *P. marginatus* umumnya merupakan hama pada tanaman pertanian. Bagian tanaman yang diisap oleh kutu putih adalah bagian kelopak bunga, tunas daun dan buah. Gejala serangan diketahui dari gumpalan-gumpalan putih pada bagian tanaman yang terserang, selanjutnya bagian tanaman tersebut akan mengerut, mengering dan akhirnya pertumbuhan tanaman tersebut menjadi terhambat. Serangan berat dapat menyebabkan daun dan buah gugur dini (Walker *et al.* 2006).

Kutu putih famili Pseudococcidae memiliki banyak spesies lain, di antaranya *Ferrisia virgata*, *Pseudococcus longispinus*, *Macronellus hirsutus*, dan *Planococcus citri* dengan bentuk dan warna tubuh yang hampir mirip jika dilihat sepintas. Untuk dapat membedakan *P. marginatus* dengan jenis kutu putih lain adalah dengan melihat bentuk tubuh, warna tubuh, bentuk filamen lilin diseluruh tubuh, filamen anal, dan kantung telur.

Serangga *P. marginatus* yang menyerang tanaman pepaya di Bogor Indonesia, perkembangbiakannya bersifat seksual. Rata-rata siklus hidup untuk satu generasi kutu putih adalah 25 hari dan reproduksi berlangsung sepanjang tahun. Telur yang diletakkan berwarna kuning kehijauan dan dilindungi oleh benang-benang putih seperti kapas yang disebut kantung telur (*ovisac*). Ukuran panjang kantung telur empat kali lipat panjang tubuh (Walker *et al.* 2006). Setelah dibuat preparat memiliki ukuran panjang tubuh betina dewasa 2,2 mm dengan lebar tubuh 1,4 mm (Walker *et al.* 2006). Jantan dewasa ukuran tubuhnya lebih kecil dibandingkan dengan betina dewasa (Gambar 1).

Imago betina tidak bersayap dan memiliki alat mulut yang berkembang baik sebagai

pengisap cairan tanaman. Tubuh serangga jantan untuk instar pertama berwarna kuning dan ke-dua berwarna merah muda kemudian masuk tahap prapupa, pupa, dan dewasa. Jantan dewasa memiliki sepasang sayap yang berkembang baik, tetapi alat mulutnya tereduksi (Walker *et al.* 2006). Serangga yang paling aktif merusak tanaman pepaya adalah betina dewasa.

Gambar 2. Serangga *Paracoccus marginatus*. Betina (A) (Foto: Rauf) dan Jantan (B) (Foto: Sartiami)

Sejak pertama kali ditemukan pada awal tahun 2008 serangan kutu *P. marginatus* di Bogor populasinya terus meningkat dan mengakibatkan produktivitas pepaya menurun bahkan tanaman tidak lagi mampu memproduksi. Pada keadaan serangan berat ini, seluruh permukaan bawah daun dan permukaan buah berwarna putih karena penuh ditutupi kutu *P. marginatus*. Pucuk tanaman yang terserang tampak tumbuh kerdil.

Tahapan serangan kutu *P. marginatus* berawal dari bagian daun muda yang dekat dengan pangkal batang, mengakibatkan daun

menjadi keriting dan tumbuh tidak normal. Pertumbuhan daun yang tidak normal secara tidak langsung akan mengganggu proses fotosintesis tanaman. Saat kegiatan fotosintesis terhambat maka pertumbuhan tanaman akan terhambat menjalankan kegiatan fisiologi, karena sebagian besar energi yang dibutuhkan oleh tanaman dihasilkan di daun. Akibatnya tanaman mengalami kehilangan energi saat cairan tanaman diserap oleh hama dan ketika daun rusak tidak dapat menghasilkan energi bagi tanaman. Dengan demikian tanaman akan semakin merana dan akhirnya buah yang di produksi tidak maksimal dan atau tidak berproduksi.

Kutu *P. marginatus* merupakan serangga polifag, maka setelah tanaman pepaya yang terserang mati kutu *P. marginatus* yang masih bertahan hidup dapat berpindah ke tanaman lain (Walker *et al.* 2006). Perpindahan dan menetapnya hama kutu *P. marginatus* pada areal lain dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik seperti suhu, ketersediaan tanaman inang dan regulasi pemerintah dalam mengatur perpindahan materi tanaman dari satu daerah ke daerah lainnya. Menurut Walker *et al.* (2006) populasi kutu *P. marginatus* akan meningkat dengan cepat apabila telah menyebar dan menempati kawasan baru yang mana tidak terdapat musuh alaminya.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan data instansi pertanian Kabupaten dan Kota Bogor tampak bahwa serangan hama *P. marginatus* telah tersebar merata di seluruh wilayah Bogor, dengan serangan berat terutama terjadi di wilayah barat dan tengah Kabupaten Bogor (Gambar 2).

Gambar 2. Peta penyebaran *Paracoccus marginatus* di Bogor pada tahun 2009

Beberapa kecamatan yang menunjukkan tingkat serangan berat pada semua desa survei adalah Kecamatan Sukaraja, Megamendung, Bojonggede, Tajurhalang, Rancabungur, dan Caringin. Tingkat serangan berat ditemukan pada lahan-lahan yang petani sudah tidak mampu lagi mengendalikan hama tersebut, serta pada area pekarangan tanpa pengendalian.

Khusus untuk wilayah barat dan tengah Kabupaten Bogor, kutu *P. marginatus* telah tersebar di 22 kecamatan dan 80 desa yaitu: Kecamatan Sukaraja dengan intensitas serangan 89%, Cijeruk (81%), Caringin (84%), Ciawi (84%), Megamendung (92%), Leuwisadeng (86%), Nanggung (76%), Leuwilliang (88%), Bojonggede (87%), Tajurhalang (82%), Parung (66%), Gunung Sindur (88%), Kemang (84%), Cibungbulang (78%), Pamijahan (79%), Rumpin (88%), Ciomas (79%), Rancabungur (89%), Ciampea (87%), Cibinong (58%), Babakan Mandang (53%), dan Dramaga (75%) (Gambar 2). Di tingkat nasional dilaporkan bahwa hama kutu *P. marginatus* telah tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia (Ditlinhorti 2009), dan terakhir ini dijumpai di Maluku (pengamatan lapangan penulis) dan di Papua (Acer, komunikasi pribadi).

Kutu putih dapat menyebar dari satu tempat ke tempat lain melalui bantuan angin, menempel pada burung atau hewan lainnya, terbawah pakaian atau bahan tanaman yang diperdagangkan (Meyerdirk 1999; Rauf 2009). Pertumbuhan populasi yang cepat terkait dengan siklus hidup yang singkat (25 hari) dan keperidiannya yang tinggi (500 butir telur), serta didukung iklim yang kering (Amarasekare *et al.* 2008). Adanya serangan hama kutu putih ini mengakibatkan para petani di wilayah barat dan tengah Kabupaten Bogor lebih memilih menanam tanaman ubi kayu daripada pepaya. Penggantian tanaman ini memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif dengan mengganti tanaman maka petani memperoleh pendapatan. Dampak negatifnya siklus hidup kutu *P. marginatus* tetap berlangsung karena ubi kayu merupakan salah satu inangnya.

Penurunan produksi pepaya secara terus-menerus akan mengurangi pendapatan ekspor buah Indonesia dan dikhawatirkan jika tidak ada upaya pengendalian yang tepat dan cepat produksi buah pepaya Indonesia dapat punah. Menurut Amarasekare *et al.* (2008) karena pertumbuhan yang cepat, sintasan tinggi, kapasitas berkembang biak tinggi dari kutu *P.*

marginatus, mendukung peningkatan populasi yang berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan pada sejumlah besar hasil pertanian. Untuk itu pengetahuan tentang daerah persebaran, jenis komoditi yang di serang, dan faktor lingkungan menjadi informasi penting dalam mempelajari kehidupan kutu *P. marginatus* dan penentuan pengambilan keputusan pengendalian hama yang tepat. Pengendalian yang tidak tepat baik pada penentuan jenis pestisida dan stadia-stadia rentan dari hama hanya menambah biaya pengendalian dalam kegiatan usahatani seperti yang telah dilakukan oleh petani pepaya di Kecamatan Sukaraja pada tahun 2009.

Menurut Townsend *et al.* (2000 dalam Amarasekare 2008) pengetahuan waktu aplikasi yang tepat disesuaikan dengan stadia-stadia rentan, seperti yang dikemukakan bahwa kutu putih instar awal lebih mudah untuk dikontrol dari pada instar lanjut, dengan demikian waktu aplikasi baiknya menggunakan waktu pertumbuhan instar awal kemunculan. Aplikasi insektisida yang digunakan untuk mengendalikan kutu *P. marginatus* adalah lebih dari dosis normal, karena tubuhnya dilindungi oleh lapisan lilin yang tebal, kantung telur dan sifat hama yang sering bersembunyi dalam daun dan kuncup yang rusak (Walker *et al.* 2006). Untuk itu pengendalian secara kimia tidak efektif seluruhnya karena membutuhkan aplikasi berkala, terlebih saat insektisida tidak bersifat spesifik dapat mematikan agens hayati (musuh alami) dan timbulnya resistensi hama.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Pada tahun 2009 hama *P. marginatus* pada tanaman pepaya dijumpai di seluruh kecamatan yang termasuk wilayah barat dan tengah, Kabupaten Bogor, dengan tingkat serangan berat. Tingkat serangan yang sama dilaporkan juga terjadi di wilayah Kota Bogor. Tingkat serangan berat pada semua desa survei adalah Kecamatan Sukaraja, Caringin, Megamendung, Bojonggede, Tajurhalang, dan Rancabungur.

4.2. Saran

Perlu dilakukan survei lanjutan untuk melihat serangan *P. Marginatus* di Bogor pada musim tanam yang berbeda untuk melihat populasi dan tingkat serangan serta memperluas daerah survei pada lokasi-lokasi sentra produksi pepaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarasekare K, Mannion KM, Osborne LS, Epsky ND. 2008. Life history of *Paracoccus marginatus* (Hemiptera: Pseudococcidae) on four host plant species under laboratory conditions. *Environ. Entomol.* 37(3): 630–635.
- Black JA dan Dean J C. 2001. Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Refika Aditama Bandung.
- Ditlinhort. 2009. Waspada serangan kutu putih pada tanaman papaya <http://www.hortikultura.deptan.go.id>. 18 September 2008.
- Meyerdirk DE. 1999. Control of papaya mealybug, *Paracoccus marginatus* (Homoptera: Pseudococcidae). Environment Assessment, USDA, APHIS, PPQ, 20 pp.
- Monografi Dinas Pertanian. 2009. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Bogor
- Rauf A. 2009. Pest Risk Analysis: *Paracoccus marginatus*. Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB. 8 pp.
- Unterstenhofer G. 1976. *The basic principle of crop protection field trials*. In Pflanzerschutz. Nachrichten Bayer Vol. XXIX. No. 2. Bayer Pflanzerschutz Leverkusen. Hlm 82-180.
- Walker A, Hoy M, Meyerdirk D. 2006. Papaya mealybug (*Paracoccus marginatus* Williams and Granara de Willink (Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)). Featured Creatures. Gainesville, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. http://entnemdept.ufl.edu/creatures/fruit/mealybugs/papaya_mealybug.htm