PARAMETER POPULASI DAN TINGKAT EKSPLOITASI IKAN TONGKOL (*Euthynnus affinis*) DIPERAIRAN PULAU MOROTAI

UMAR TANGKE

Staf Pengajar FAPERTA UMMU-Ternate, E-mail: khakafart@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2013 di perairan pulau Morotai. Penelitian dengan menggunakan metode survey lapangan untuk mendapatkan gambaran yang mewakili aspek dinamika populasi ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) bertujuan untuk mengkaji parameter dinamika populasi dan tingkat eksploitasi ikan tongkol sebagai bahan masuk kepada nelayan dan pemerintah untuk penegelolaan sumberdaya tersebut agar tetap berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai parameter pertumbuhan ikan tongkol di perairan pulau Morotai memiliki nilai $L_{\infty} = 42.53$, $K = 0.5$ dan $t_0 = -0.32$ dengan nilai mortalitas alami (M) 10.5, mortalitas penangkapan (F) 0.93 dan mortalitas total (Z) 1.98 serta tingkat eksploitasi (E) 0.47 telah mendaketai tingkat optimum (0.5) sehingga disarankan agar untuk tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan tongkol di perairan pulau Morotai, maka tidak perlu ada penambahan armada dan jumlah waktu penangkapan.

Keyword : Tongkol, *Euthynnus affinis*, Pulau Morotai.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan usaha penangkapan di Kabupaten Pulau Morotai sebagian besar menggunakan alat tangkap *purse seine*, *gillnet*, bagan dan pancing yang umumnya di tujukan untuk menangkap jenis ikan pelagis dan. Produksi ikan pelagis khususnya ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) di Kabupaten Pulau Morotai sejak tahun 2008 hingga 2012 mengalami peningkatan yang sangat besar, ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah unit penangkapan, dimana jumlah produksi ikan tongkol pada tahun 2008 sebanyak 4.625 Ton meningkat pada tahun 2012 menjadi 6.837 Ton (Gambar 1).

Gambar 1. Produksi Hasil Tangkapan Ikan Tongkol
(Sumber : DKP Kab. Pulau Morotai)

Ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) (Gambar 2) termasuk ikan pelagis yang hidup di permukaan laut atau didekatnya dan merupakan salah satu jenis ikan ekonomis penting. Ikan tongkol oleh masyarakat pulau Morotai (Gambar 3) ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku produk olahan perikanan seperti ikan asin, ikan bakar, pindang, tepung ikan dan surimi. Selain itu ikan tongkol juga diperdagangkan dalam keadaan segar. Berdasarkan statistik perikanan tangkap DKP Kabupaten Morotai tahun 2008-2012 (Gambar 1) terjadi peningkatan produksi seiring meningkatnya upaya. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian sumberdaya ikan tongkol, sehingga diperlukan adanya dasar pengelolaan ikan tongkol agar tetap optimal, lestari dan berkelanjutan antara lain melalui pendekatan dinamika populasi dan biologi reproduksi.

Gambar 3. Peta Pulau Morotai (lokasi penelitian)

Permintaan akan produk perikanan yang terus meningkat tentunya memiliki makna positif bagi pengembangan perikanan tangkap, tetapi tuntutan pemenuhan kebutuhan akan sumberdaya tersebut akan diikuti oleh tekanan eksploitasi sumberdaya

ikan yang semakin intensif. Jika tidak dikelola secara bijaksana, sangat dikhawatirkan pemanfaatan sumberdaya secara intensif akan mendorong usaha perikanan tangkap kejurang kehancuran dan terjadinya berbagai konflik dalam upaya memperoleh sumberdaya ikan.

Upaya untuk mengatasi pemanfaatan sumberdaya ikan yang dikelola secara intensif dapat dilakukan dengan pengelolaan seoptimal mungkin dan secara berkesinambungan tanpa mengganggu kelestarian dari sumberdaya ikan. Pada prinsipnya pengelolaan sumberdaya perikanan dimaksudkan untuk mengatur intensitas penangkapan agar diperoleh hasil yang optimal. Untuk mendukung hal tersebut perlu adanya data dan informasi yang cukup mengenai aspek dinamika populasi dari sumberdaya ikan yang di kelola termasuk ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) yang ada di perairan Pulau Morotai.

Kelestarian sumberdaya perikanan dapat dipertahankan dengan cara pengelolaan penangkapan yang didasarkan pada informasi-informasi dinamika populasi ikan yang sangat berkaitan dengan sifat bioekologi, diantaranya parameter dinamika populasi. Studi tentang aspek dinamika populasi ikan tongkol pada dasarnya ditujukan untuk menentukan ukuran badan sebagai fungsi dari waktu. Pengetahuan ini penting karena memberikan informasi tentang jumlah dan ukuran yang dapat ditangkap oleh nelayan setiap tahunnya dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya.

1.2. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengkaji parameter dinamika populasi dan tingkat eksploitasi ikan tongkol (*Euthynnus affinis*). Manfaat penelitian adalah sebagai bahan masukan untuk pengelolaan sumberdaya ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) melalui pendekatan aspek dinamika populasi agar perikanan tongkol dapat dimanfaatkan secara maksimal, lestari dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di pulau Morotai selama bulan Agustus - Oktober 2013, dengan metode survey lapang untuk mendapatkan gambaran yang mewakili aspek dinamika populasi. Data panjang ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) dikumpulkan dari nelayan dengan interval waktu 8 hari selama 3 bulan.

Data hasil pengukuran panjang ikan tongkol ditabulasi ke tabel distribusi frekuensi menggunakan program Excel 2007, Estimasi panjang infinity (L_{∞}) dan koefisien pertumbuhan (K), dengan menggunakan formula Von Bertalanffy (Sparre dan Venema, 1999):

$$L_t = L_{\infty} (1 - \exp^{-K(t-t_0)}) , \text{ Dengan } L_{\infty} = a/1-b \text{ dan } K = (-1/\Delta t) \ln b$$

Dimana L_t = Panjang ikan tongkol (cm) pada umur t (tahun), L_{∞} = Panjang asimptot ikan tongkol (mm), K = Koefisien pertumbuhan (per tahun), t_0 = Umur teoritis ikan tongkol saat panjang sama dengan nol (tahun) dan t = Umur ikan tongkol (tahun). Pendugaan umur teoritis saat panjang ikan tongkol sama dengan nol (t_0) menggunakan rumus empiris Pauly dalam Sparre et al. (1999):

$$\log (-t_0) = -0,3922 - 0,2752 \log L_{\infty} - 1,308 \log K$$

Laju mortalitas alami (M) diduga menggunakan hubungan empiris (Pauly, 1983):

$$\text{Log } M = 0.0066 - 0.279 \text{ Log } L_{\infty} + 0.6543 \text{ Log } K + 0.4634 \text{ Log } T$$

L_{∞} = parameter pertumbuhan (cm) dan T = rata-rata suhu lingkungan perairan tahunan ($^{\circ}\text{C}$) = 29.4°C . Mortalitas penangkapan (F) ditentukan dengan mengurangi M terhadap Z dan laju eksploitasi (E) ditentukan dari Z/F serta ukuran pertama kali tertangkap. Yield per rekrutment (Y/R), diketahui dari persamaan Beverton dan Holt (Sparre et al, 1999), yaitu :

$$\left(\frac{Y}{R}\right) = E \cdot U^{m/k} \cdot 1 \left(-\frac{3U}{1+m} + \frac{3U^2}{1+2m} + \frac{U^3}{1+3m} \right)$$

Dimana:

$$U = 1 - L_c / L_{\infty} \text{ dan } m = (1-E)/M/K$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ikan komo (*Euthynnus affinis*) merupakan komoditi perikanan tangkap yang dominan dari perairan pulau Morotai yang di eksploitasi dengan menggunakan alat tangkap *purse seine*, *gill net*, bagan dan pancing. Tiga dan empat jenis alat tangkap (*purse seine*, *gill net* dan bagan) merupakan jenis alat tangkap yang paling dominan dipakai oleh nelayan dengan mobilitas yang tinggi di perairan pulau Morotai sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap potensi sumberdaya ikan tongkol. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan tongkol maka perlu dilakukan pemantaun terhadap parameter populasi diantaranya frekuensi panjang, pertumbuhan, mortalitas, laju eksploitasi serta Y/R sehingga jenis ikan tongkol dalam pemanfaatannya dapat berkelanjutan. Hasil analisis terhadap parameter populasi ikan tongkol disajikan sebagai berikut.

3.1. Frekuensi Panjang dan Kelompok Umur

Jumlah sampel ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) yang diukur selama penelitian adalah 2.851 ekor dengan kisaran panjang antara 16.0 – 41.3 cm, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan kelas ukuran untuk dihitung frekuensi menurut kelompok umur. Frekuensi terbesar selama penelitian terdapat pada interval kelas 29 – 29.9 dengan jumlah 244 ekor dari total hasil tangkapan, sedangkan frekuensi terkecil terdapat pada interval kelas 39 - 39.9 dengan jumlah 40 ekor dari total hasil tangkapan. Hasil analisis Battcharya (Sparre dan Venema, 1999) dengan menggunakan pemetaan selisih logaritma natural frekuensi teoritis terhadap nilai tengah kelas ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) di perairan pulau Morotai maka diperoleh tiga kelompok umur (Gambar 4) dengan tiga ukuran panjang rata-rata masing-masing 19.8 cm, 28.8 dan 37.6 cm (Gambar 5).

Gambar 4. Grafik frekuensi hasil tangkapan ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) di perairan laut pulau Morotai

Gambar 6. Nilai tengah kelas dengan selisih logaritma natural frekuensi kumulatif ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) pada setiap kelompok umur

Sebaran aktual panjang ikan tongkol di perairan pulau Morotai lebih kecil bila dibandingkan dengan panjang ikan tongkol yang disajikan pada Tabel 1 diantaranya di Pelabuhan Ratu (Nurhayati, 2001), pesisir teluk Persia dan laut Oman (Motlagh et al, 2010), perairan Indian (Rohit et al, 2012), perairan Natuna (Fayerti et al, 2013) dan Laut Jawa (Chodriyah et al, 2013). Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan sebaran frekuensi panjang ikan tongkol yang berbeda pada setiap perairan. Perbedaan ukuran panjang ikan yang tertangkap diduga karena perbedaan alat tangkap yang digunakan, kondisi lingkungan dan variasi intensitas penangkapan (Motlagh et al, 2010).

Tabel 1. Beberapa hasil penelitian mengenai parameter pertumbuhan ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) di berbagai perairan.

Sumber	Lokasi	Parameter Pertumbuhan			Panjang (Cm)	
		K	L^{∞} (Cm)	t_0	Min	Maks
Nurhayati (2001)	Pelabuhan Ratu	0.48	75.12	-0.26	20	60
Motlagh et al (2010)	Pesisir Teluk Persia dan Laut Oman	0.51	87.6	-0.23	41	85
Rohit et al (2012)	Perairan Indian	0.56	81.20	-0.03	14	80
Fayerti et al (2013)	Perairan Natuna	0.23	54.0	-0.27	30.5	49.5
Chodriyah et al (2013)	Laut Jawa	0.91	59.63	-0.178	11.7	55.4
Penelitian ini (2014)	Perairan Pulau Morotai	0.5	42.53	-0.32	16.0	41.3

3.2. Pertumbuhan

Hasil analisis parameter pertumbuhan berupa panjang asimtotik (L^{∞}), koefisien pertumbuhan (K) dan umur teoritis ikan pada saat panjang ikan nol (t_0) masing-masing adalah $L^{\infty} = 42.53$, $K = 0.5$ dan $t_0 = -0.32$, jika dibandingkan dengan hasil penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya untuk nilai parameter pertumbuhan diantaranya Panjang asimptotik (L^{∞}), koefisien pertumbuhan (K) dan umur teoritis ikan pada saat panjang ikan nol (t_0) yang disajikan pada Tabel 1, maka hasil penelitian di perairan pulau Morotai memiliki nilai parameter pertumbuhan yang kecil. Kecilnya nilai parameter pertumbuhan dari ikan tongkol di perairan pulau Morotai dibandingkan dengan hasil penelitian lainnya (Tabel 1) juga diduga karena perbedaan ukuran panjang ikan yang tertangkap, perbedaan alat tangkap yang digunakan, kondisi lingkungan serta variasi

intensitas penangkapan (Motlagh et al, 2010). Berdasarkan ketiga nilai parameter pertumbuhan yang didapatkan pada perairan pulau Morotai, jika dengan menggunakan persamaan pertumbuhan Von Bertalanffy didapatkan persamaan pertumbuhan ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) di perairan pulau Morotai adalah $L_t = 42.53 (1 - e^{0.5(t + 0.32)})$.

Persamaan pertumbuhan tersebut digunakan untuk menganalisis panjang ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) di perairan pulau Morotai untuk setiap umur relatif sehingga dapat dihitung pertambahan panjang setiap tahunnya hingga mencapai panjang asimptotnya (Gambar 6).

Gambar 6. Kurva pertumbuhan ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) di perairan laut pulau Morotai

3.3. Mortalitas

Penggunaan persamaan Beverton dan Holt (1986) dalam Sparre dan Venema (1999) berbasis data panjang yang dihitung secara manual didapat nilai mortalitas total (Z) dari spesies ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) di perairan pulau Morotai adalah 1.98 per tahun dengan laju mortalitas alami dan mortalitas penangkapan dihitung berdasarkan hubungan empiris Pauly (1983) yang menyarankan untuk memperhitungkan juga kebiasaan ikan yang bergerombol seperti ikan tongkol yang dikalikan dengan nilai 0.8 untuk mendapatkan nilai dugaan menjadi 20% lebih rendah, dimana hasil analisis laju mortalitas alami (M) adalah 1.05 dengan suhu perairan selama penelitian adalah 29.5 °C. Laju mortalitas penangkapan (F) adalah 0.93 yang didapat dari hasil pengurangan mortalitas total dan mortalitas alami (Z – M).

Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan data penangkapan selama 3 bulan dapat disimpulkan bahwa pada perairan pulau Morotai mortalitas penangkapan ikan tongkol mendekati mortalitas alami (M = 1.05 dan F = 0.93), hal ini diduga karena telah banyak penangkapan dilakukan oleh nelayan, karena nelayan pulau Morotai melakukan operasi penangkapan ikan hampir sepanjang tahun pada setiap musim penangkapan.

3.4. Laju Eksploitasi dan Y/R

Pendugaan stock yield per recruitment merupakan model yang biasa digunakan sebagai dasar strategi pengelolaan perikanan. Analisis ini sangat diperlukan dalam

pengelolaan sumberdaya perikanan, karena model ini dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh jangka pendek dan panjang dari kegiatan yang berbeda (Gulland, 1983). Hasil analisis terhadap nilai dugaan yield per recruit dengan menggunakan metode Beverton dan Holt dengan memasukkan nilai parameter populasi diantaranya Koefisien laju pertumbuhan ($K = 0.5$), Panjang asimptot ($L_{\infty} = 42.53$), Mortalitas total ($Z = 1.98$), mortalitas alami ($M = 1.05$), mortalitas penangkapan ($F = 0.93$) dan laju eksploitasi ($E = 0.47$). Hasil yield per recruit dengan menggunakan nilai-nilai tersebut maka didapat dugaan Y/R adalah sebesar 0.025 gram/recruit yang diambil sebagai hasil tangkapan.

Laju eksploitasi populasi ikan dikatakan sudah mencapai lebih tangkap (*overfishing*) jika nilai $E_{opt} = 0.5$. Hasil analisis laju eksploitasi ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) diperairan pulau Morotai adalah 0.47, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi ikan tongkol diperairan pulau Morotai mendekati tingkat maksimum. Untuk menjaga agar populasi ikan tetap stabil pada perairan pulau Morotai ini maka tingkat eksploitasi disarankan untuk tetap dipertahankan atau ditingkatkan sampai mencapai tingkat optimum yaitu $E_{opt} = 0.5$. Penangkapan optimum terjadi, jika dan hanya jika populasi berada dalam keadaan seimbang (jumlah peremajaan = kematian, migrasi dan emigrasi) (Susilo, 1995).

IV. PENUTUP

Hasil penelitian terhadap parameter populasi ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) diperairan pulau Morotai dapat disimpulkan bahwa nilai parameter pertumbuhan ikan tongkol adalah $L_{\infty} = 42.53$, $K = 0.5$ dan $t_0 = -0.32$ dengan laju mortalitas alami 1.05, mortalitas penangkapan 0.93 dan mortalitas total =1.98 serta tingkat eksploitasi adalah 0.47, dimana nilai tingkat eksploitasi tersebut telah mendekati tingkat optimum sehingga disarankan agar sumberdaya ikan tongkol dapat terjaga dalam pemanfaatan, maka tidak perlu ada penambahan jumlah armada dan jumlah waktu penangkapan.

DAFTAR PUSTAKA

- DKP Kabupaten Pulau Morotai, 2013. Laporan Tahunan Statistik Perikanan tangkap Kabupaten Pulau Morotai.
- Effendie MI. 2002. Biologi Perikanan. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Chodrijah U, Thomas H dan Teguh N,. 2013. Estimasi Parameter Populasi Ikan Tongkol komo (*Euthynnus affinis*) di Perairan Laut Jawa. Jurnal Bawal Vol 5 (3) Des. 2013: 167-174
- Fayerti W R, Efrizal T, Zulfikar. 2013. Kajian Analitik Stok Ikan Tongkol (*Euthynnus affinis*) berbasis Data Panjang Berat yang Didaratkan di Tempat Pendaratan Ikan Pasar Sedanu Kabupaten Natuna. Jurnal Umrah.
- Gulland, J.A. 1983. *Fish Stock assessment A Manual Basic Methods*. Wiley. New York.
- Nurhayati, S. 2001. Analisis beberapa aspek potensi ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) di perairan pelabuhan Ratu (Skripsi). Institut Pertanian Bogor.
- Motlagh TSA, Hashemi SA, Kochanian P. 2010. *Population Biology and Assessment of Kawakawa (Euthynnus affinis) in Coastal Waters of the Persian Gulf dan Sea of Oman (Hormozgan Province)*. Iranian Journal of Fisheries Sciences 9 (2) : 315-326.
- Pauly, D. 1983. Some Simple Method For The Assessment of Tropical Fish Stock. FAO Fisheries Technical Paper. 52p.

- Rohid P, Chellappan A, Abdussamad EM, Joshi KK, Koya KPS, Sivadas M, Ghosh little tuna, *Euthynnus affinis* (Cantor, 1849) exploited from Indian Waters . Indian J. Fish. 59 (3): 33-42.
- Sapre, P dan S. C. Venema. 1999. Introduksi Pengkajian Stok Ikan Tropis. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jakarta, Indonesia. Jakarta.
- Susilo, S.B.1995. Model-Model Penting dalam Dinamika Populasi dan Pengelolaan Stok Ikan. Komplemen Diktat Kuliah Dinamika Populasi Ikan dan Biologi Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor.